

# ESTUDIO PILOTO SOBRE HÁBITOS SEXUALES EN ASISTENTES A LA CELEBRACIÓN DEL BENIDORM PRIDE 2019

Pujades Tàrraga A<sup>1</sup>, Revilla Lorenzo T<sup>2</sup>, Garijo Saiz A<sup>1</sup>, Gil Anguita C<sup>3</sup>, Pérez Torres S<sup>2</sup>, Marcheras M<sup>4</sup>, Molina D<sup>4</sup>, Gómez C<sup>5</sup>, Amador Prous C<sup>3</sup>.

1. M. Interna, Hospital Marina Baixa, Villajoyosa. Alicante. 2. Centro de Salud Pública de Benidorm. 3. Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Marina Baixa, Villajoyosa. Alicante. 4. ACAVIH (Associació Ciutadana d'Alacant d'afectats i afectades pel VIH-SIDA). 5. CALCSICOVA (Coordinadora de Asociaciones de Lucha Contra El Sida de la Comunidad Valenciana).

## INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS

El Departamento de Salud de la Marina Baixa en Alicante, tiene una población censada de unos 166.000 habitantes y cuenta con una de las tasas más elevadas de infecciones de transmisión sexual (ITS) de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, no se han desarrollado medidas específicas para disminuir la incidencia, ni se dispone de información epidemiológica detallada.

1) Valorar conductas de riesgo en la población asistente a la celebración del *Benidorm Pride* para orientar en el diseño de estrategias de prevención y diagnóstico precoz de ITS.

2) Ofertar el cribado de VIH mediante test rápidos de saliva y sangre a los asistentes.

## MÉTODOS

-Se realizó un estudio piloto observacional, descriptivo, transversal sobre conductas de riesgo de las personas que voluntariamente realizaron una encuesta anónima.

-Se estableció un punto de salud sexual donde se proporcionaba información sobre prevención, se entregaban preservativos y se realizaban pruebas rápidas de VIH (OraQuick® y LABMEN®).

-Se contó con la participación de ACAVIH y CALCSICOVA así como profesionales sanitarios del Centro de Salud Pública de Benidorm y del hospital de la Marina Baixa.



## RESULTADOS

### Edad

media 35 años (18-70)

♂ 83%

116 encuestas

### Nacionalidad

España 66.4%  
Países Europeos 22.4%  
Sudamérica (Colombia) 8.6%  
Turistas 17.4%

65 test VIH  
57 en saliva (2 positivos)

Realización previa de VIH  
63%

Habían recibido profilaxis pre exposición no ocupacional 7%  
En PrEP 6%

Relaciones sexuales no protegidas en los 3 meses anteriores 68%  
Entre 11 y 50 parejas sexuales en el último año 20%

ITS previas: 9.6%

→ Sífilis, la más frecuente

Consumo de drogas durante la práctica sexual: 28%

→ Alcohol, Popper y Cannabis

MOTIVOS PARA REALIZARSE EL TEST VIH (multirrespuesta)	N	(%)
Conocer mi estado de salud	82	70.7%
Sexo vaginal no protegido	13	11.2%
Sexo anal no protegido	31	26.7%
Sexo oral no protegido	31	26.7%
Rotura del condón	11	9.5%
Sexo no protegido con trabajadores del sexo	3	2.6%
Contacto sexual con VIH (+)	7	6%
Compartir material de inyección en uso de drogas	2	1.7%
Al menos 4 respuestas seleccionados	7	6%

## CONCLUSIONES

- Más de dos tercios de las personas con riesgo de ITS no utilizan preservativos y un tercio no se ha hecho nunca un test de VIH.
- Es urgente diseñar estrategias eficaces que impacten en el diagnóstico precoz de las ITS en población especialmente expuesta, así como acercar la información y la prevención a quienes no acuden a centros sanitarios. El consumo de drogas no está dimensionado en nuestra zona.